

Hình ảnh Sùi mào gà giai đoạn đầu

Bệnh mào gà là căn bệnh vô cùng khó lây nhiễm, gây không ít ảnh hưởng tiêu cực cho sức khỏe, nhất là khả năng sinh sản. Nếu phát hiện và chữa bệnh sùi mào gà giai đoạn đầu, các tác động tiêu cực này sẽ được tổng lùi 1 giải pháp hiệu quả, ngăn ngừa hậu quả trầm trọng.

Bệnh sùi mào gà giai đoạn đầu là gì?

Bệnh mồng gà (mụn cóc sinh dục) là bệnh do vi rút Human Papillomavirus (HPV) chủng 6, 11, 16, 18 gây ra. Bệnh truyền nhiễm qua nhiều đường như giao hợp tình dục, qua một số vết xây chà xát trên da, truyền từ mẹ sang con. 1 Tỷ lệ lây truyền khi tiếp xúc thẳng, sử dụng tổng quan một số vật dụng cá nhân của người bị bệnh như bàn chải đánh răng, khăn mặt, dụng cụ cắt móng tay...

Virus HPV khi thâm nhập vào người thường ủ bệnh trong tầm khoảng vài tuần, vài tháng, thậm chí lên tới vài năm. Thông thường, thời gian ủ bệnh là 3 tháng. Sau thời kỳ ủ bệnh, cơ thể sẽ bắt đầu thấy những nốt sang thương nhỏ, màu nhạt, tọa lạc rải rác... Đây chủ yếu là giai đoạn đầu bệnh sùi mào gà. (1)

Tác nhân mắc bệnh sùi mào gà ở cả nam và nữ giới

Căn nguyên dẫn tới *Bệnh sùi mào gà tại bạn nam* cùng với phái đẹp chưa có không ít sự khác. Trong số đó, vi rút HPV chủ yếu là hung thủ gây nên bệnh tại cả hai giới. (2)

Phần lớn người có "làm chuyện ấy" tình dục đều có khả năng nhiễm vi khuẩn HPV tại 1 thời điểm nào đó trong đời. Một số yếu tố khiến tăng nguy cơ nhiễm bệnh gồm:

- "làm chuyện ấy" tình dục không lấy các phương pháp an toàn.
- Giao hợp tình dục chưa biết rõ tiền sử tình dục của đối phương.
- Nhiều người yêu.
- Bị những bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục khác biệt.
- Quan hệ tình dục kịp thời.
- Hệ miễn dịch kém như cơ thể bị nhiễm HIV hoặc cơ thể sử dụng thuốc chống bài tiết ghép.
- Cơ thể dưới 30 tuổi.
- Cơ thể hút thuốc lá.
- Người có mẹ bị nhiễm vi khuẩn HPV.

Dấu hiệu bệnh mồng gà tại chị em giai đoạn đầu

Triệu chứng bệnh mồng gà ở phụ nữ giai đoạn đầu thực tế rất không dễ dàng nhận biết. 1 Phần do cấu tạo bộ phận sinh sản tại phái đẹp ẩn sau trong người chị em phụ nữ. Khu vực các nhú sùi xuất hiện thường là ở đường "cô bé", vô cùng khó quan sát bằng mắt thường. Những dấu hiệu nhận biết bệnh mào gà ở chị em trong giai đoạn đầu gồm:

<https://www2.sgc.gov.co/sgc/volcanes/Documents/kham-chua-benh-giang-mai-o-ha-noi.htm>

[https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/InformesPQRD/Borrar/phong-kham-da-khoa-thai-ha.h
tm](https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/InformesPQRD/Borrar/phong-kham-da-khoa-thai-ha.h
tm)

<https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/InformesPQRD/Borrar/hinh-anh-sui-mao-ga.htm>

<https://www2.sgc.gov.co/sgc/volcanes/Documents/blog/benh-xa-hoi.html>

<https://www2.sgc.gov.co/sgc/volcanes/ComplejoVolcanicoDonaJuana/SiteAssets/cac-benh-xa-hoi.html>

<https://www2.sgc.gov.co/sgc/volcanes/ComplejoVolcanicoDonaJuana/SiteAssets/gai-sinh-duc.html>

<https://www2.sgc.gov.co/sgc/volcanes/ComplejoVolcanicoDonaJuana/SiteAssets/dot-sui-mao-ga.html>

<https://www2.sgc.gov.co/sgc/volcanes/Documents/chi-phi-xet-nghiem-xa-hoi-bao-tien.html>

<https://www2.sgc.gov.co/sgc/volcanes/Documents/blog/chi-phi-xet-nghiem-giang-mai.html>

<https://www2.sgc.gov.co/sgc/volcanes/VolcanNevadoRuiz/SiteAssets/blog/chi-phi-xet-nghiem-xa-hoi-bao-tien.html>

- Thấy nốt mụn xù, u nhú li ti màu hồng ở cơ quan sinh sản gồm có môi rất lớn, môi bé, cơ sở "cô bé", tầng sinh môn, xung quanh hậu môn, cổ tử cung.
- Những tổn thương không ngứa, không cảm giác đau, không xuất huyết hay tiết dịch.
- Trong môi trường âm hộ ướt át, bệnh tiến triển nhanh chóng. Các nốt u sùi mọc chú trọng thành các đám lớn, hình dáng như mào gà, súp lơ. Những nốt không dẫn đến đau đớn, dẫn tới ngứa ngáy nhưng mà dễ chảy máu, có dịch mủ.
- Bị đau đớn và xuất huyết lúc giao hợp tình dục.
- Những nốt u sùi có thể xuất hiện ở miệng khi chị em "lâm trận" tình dục bằng đường miệng.



Hình ảnh bị bệnh mào gà giai đoạn đầu tại phụ nữ

Dấu hiệu nhận biết sùi mào gà ở nam giới cấp tính

Sau khoảng thời gian ủ bệnh, người của bạn nam sẽ xuất hiện các biểu hiện như:

- Chỗ da bị bệnh thấy những nốt u nhú nhỏ với kích cỡ một - 2mm, màu hồng cùng với mọc đơn lẻ.
- Một số nốt u sùi nổi đơn lẻ, rải rác trên da, không gây đau cùng với ngứa ngáy.
- Các nốt u nhú ở giai đoạn đầu thường hay xuất hiện tại khe đầu dương vật, bao quy đầu, thân "cậu bé" cùng với bìu. Một tỷ lệ có nguy cơ mọc ở hậu môn trực tràng, chân tay, miệng, vòm họng...

Bệnh mồng gà giai đoạn đầu có gây ra ngứa không?

Người bị bệnh bệnh mồng gà ở cấp tính không mắc cảm giác đau hay ngứa ngáy. Thậm chí, các nốt u sùi xuất hiện rải rác, riêng rẽ lẻ khiến cho không ít người bị bệnh dễ dàng bỏ qua Nếu như không vô tình sờ đăng nhập. Thực tế, một tỷ lệ vì cơ địa hoặc do sức đề kháng yếu, trong cấp tính, bệnh đã xuất hiện những triệu chứng nghiêm trọng. Một số nhú sùi phát triển mạnh mẽ, kết hợp thành những mảng rộng, tiết dịch ướt át, gây ra kích ứng bề mặt da. Người bị bệnh sẽ mắc ngứa ngáy, khó chịu ở các chỗ da nhiễm bệnh.

Bệnh mồng gà cấp tính có nguy hại không?

Trong cấp tính của sùi mào gà, bệnh không gây ra đe dọa không nhỏ đến sinh hoạt hằng ngày của người bị bệnh. Do đó, rất nhiều trường hợp ngại ngùng, trì hoãn chữa. Lúc không có biện pháp can thiệp sớm, người bị bệnh có nguy cơ đối mặt với các tai biến nặng lúc bệnh tiến triển trầm trọng như:

- Nếu như lây nhiễm virus HPV chủng 16 hoặc chủng 18, người bị bệnh cần phải đối diện với khả năng ung thư dương vật, ung thư cổ tử cung, ung thư hậu môn...
- Các nốt u nhú khi phát triển to không khó mắc trầy xước, ra máu mủ khi có cọ xát mạnh. Nếu như không vệ sinh đúng cách có nguy cơ dẫn đến lở loét, viêm nhiễm cơ quan sinh dục...

Tại vì sao phỏng đoán sùi mào gà sớm cực kỳ quan trọng?

Kiểm tra sùi mào gà giúp cho bác sĩ chuyên khoa tìm thấy vi khuẩn HPV trong người người bệnh, Do đó có khả năng phỏng đoán cơ thể đó có mắc bệnh sùi mào gà hay không, đang ở mức độ nào... để có biện pháp chữa trị hợp lý, cụ thể:

Nam giới

- Định vị một số nốt u nhú ở bộ phận sinh sản có đúng bệnh mụn cóc sinh dục hoặc không.
- Thăm khám công dụng cơ quan sinh sản và trực tràng.
- Sử dụng dịch tại cơ quan sinh sản để thăm khám lậu hoặc bệnh chlamydia.
- Dùng máu để thăm khám giang mai hoặc HIV.

Phái đẹp

- Xác định một số nhú sùi ở cơ quan sinh sản có phải bệnh mụn cóc sinh dục hay không.
- Xét nghiệm tổng quan phần khung xương chậu cũng như trực tràng.
- Dùng dịch tại cơ quan sinh sản để kiểm tra lậu hoặc bệnh chlamydia.
- Dùng máu để kiểm tra giang mai hoặc HIV.
- Kiểm tra PAP hay kiểm tra HPV.

Những giải pháp trị bệnh sùi mào gà cấp tính

Vì ở cấp tính, những triệu chứng của bệnh còn nhẹ. Bởi vì thế, người bị bệnh thường hay được chỉ định chữa trị nội khoa. Thuốc chữa trị có tác dụng nhanh, dễ sử dụng tuy nhiên lại có các phản ứng phụ như đau tức, đau rát, ngứa ngứa da, phát ban, dị ứng... những dạng thuốc gồm:

- Imiquimod (Aldara): Thuốc được chỉ dẫn dành cho người trưởng thành cùng với trẻ từ 12 tuổi trở lên. Imiquimod giúp cải thiện miễn dịch tại chỗ, được sử dụng bên ngoài da, có tác dụng phụ là đỏ da, kích thích, chai, loét, trợt, mụn nước, giảm sút sắc tố...
- Axit trichloroacetic: kiểu axit này tương tự axit axetic, được dùng trong chữa Mỹ phẩm, trị mụn đầu đen và sùi mào gà. Phản ứng phụ của thuốc là kích ứng da nhẹ như ngứa ngứa, cảm giác đau, sưng... bác sĩ chuyên khoa có thể chỉ định lấy thuốc này dành cho bà bầu.
- Podophyllin và Podofilox: Đây là một loại nhựa cây có thể phá vỡ mô của những nốt sùi mào gà. Tuy vậy, podofilox (hợp chất có hoạt đặc tính không khác Podophyllin) không dùng dành cho địa điểm trong cơ quan sinh sản, chống chỉ định với thai phụ.
- Interferon hay 5-fluorouracin: Thuốc được lấy theo đường tiêm, có công dụng cải thiện hệ miễn dịch thiên nhiên, qua đây tiêu diệt vi rút HPV. Thuốc được chỉ định áp dụng dành cho một số tổn thương nhỏ, ít trầm trọng bởi chứa nhiều tác dụng phụ cùng với mức phí cao.

Các kiểu thuốc chữa trị mụn bọc bình thường hoặc những thuốc không kê đơn không thể lấy để chữa trị bệnh mồng gà. Người bệnh tránh tự tiện mua thuốc để dùng, đòi hỏi bệnh viện để được thăm khám bệnh tình và chữa đúng cách.

Giải pháp ngăn ngừa sùi mào gà sau chữa

Để phòng chống hiện tượng quay trở lại bệnh mồng gà, người bị bệnh cần phải tiến hành chữa bệnh toàn bộ cũng như toàn diện. Trong lúc thăm khám cùng với trị nên tầm khoảng soát các căn bệnh tập thể khác biệt. Đồng thời, người bị bệnh nên lưu ý:

- Bảo vệ sức đề kháng bằng phương pháp giữ làm sạch người sạch. Trong số đó, cơ quan sinh sản cần phải luôn sạch sẽ, khô thoáng cũng như được vệ sinh đúng giải pháp mỗi ngày.
- Không sử dụng sơ lược vật dụng cá nhân của người không giống để hạn chế bị lây truyền bệnh.
- Nữ cần phải tuyệt nhiên lưu ý giữ gìn làm sạch cơ thể trong thời kỳ thai nghén, trước cũng với sau thời gian có kinh.
- Chế độ dinh dưỡng cần giữ gìn toàn bộ dinh dưỡng; hạn chế một số thực phẩm cay nóng, tiêu ớt cùng với các thức dùng đựng chất kích thích như bia, rượu, cà phê...
- Trong cũng như sau việc trị, người bị bệnh không "làm chuyện ấy" tình dục khi chỗ bị thương chưa lành. Nếu như có "yêu" cần sử dụng bao lớn su hoặc một số giải pháp an toàn khác để hạn chế tiếp xúc các chỗ cơ quan sinh sản từng mắc thương tổn.
- Không nên quan hệ tình dục với rất nhiều người để giảm sút khả năng tái bệnh bộc phát cùng với lây bệnh dành cho bạn gái.
- Người bệnh cần giữ thái độ lạc quan, tinh thần vui vẻ, không nên tình trạng căng thẳng, sức ép kéo dài.
- Sau chữa, cần tái thăm khám theo lịch hẹn của bác sĩ để được quan sát, nhận thấy một số không bình thường, Do đó có phương pháp can thiệp sớm.
- Liên tiếp tập luyện thể dục thể thao để gia tăng hệ miễn dịch, khả năng miễn dịch. Điều đó sẽ giúp cho cơ thể chống lại vi rút HPV tốt hơn.